

# زەھەرلىك ياۋا موگۇ



- < خەتەرلىك ياۋا موگۇ ئادەتتە كۆزدىكى تۇنجى ياخشى يامغۇردىن كېيىن پەيدا بولىدۇ.
- < ئۇلارنى ئوتلۇق، ئورمانلىق، ئاممىۋى باغچا، بالىلار ئويۇن مەيدانى، مەكتەپ مەيدانى، دېھقانچىلىق مەيدانلىرى ۋە ئۆيىڭىزگە يېقىنراق ئۆز بېغىڭىزدىكى چىملىق، چىرىتىۋاتقان ئوغۇت ياكى سامانلىق قاتارلىق نۇرغۇن جايلاردا ئۇچراتقىلى بولىدۇ.
- < سىرتقا چىققاندا بالىلىرىڭىز ۋە ئەرمەك ھايۋانلىرىڭىزغا يېقىندىن دىققەت قىلىڭ. چۈنكى، موگۇلار ئاسانلا كۆزگە چىلىقىدۇ، ھەم يېيىشكە قىزىقارلىق كۆرۈنىدۇ.
- < چەتئەللەردە ياشىغان كىشىلەر شۇنى بىلىشى كېرەككى، ئاۋستىرالىيەدىكى زەھەرلىك موگۇ باشقا دۆلەتلەردە بايقالغان يېيىشلىك موگۇغا ئوخشايدۇ.
- < ئۆلۈم قاپاق موگۇسى ئەڭ خەتەرلىك بولۇپ، جىگەرنى ئەجەللىك زىيانغا ئۇچرىتىدۇ. پىشۇرۇش ياكى پوستنى ئىلىۋېتىش زەھەرنى چىقىرىۋېتەلمەيدۇ. ئۆلۈم قاپاق موگۇسى دۇب دەرىخى، خاسىڭ ۋە كاشتان دەرىخى بىلەن ئۆسىدۇ، ئەمما ئەجەللىك موگۇ ھەر قانداق جايدا ئۆسەلەيدۇ. يېيىشكە بولىدىغان بىردىنبىر ئىشەنچلىك موگۇ يېشىل يېمەكلىك دۇكىنىدىن ياكى تاللا بازىرىدىن سېتىۋالغان موگۇ بولىدۇ.
- < ئەگەر بىرەيلەن ئېھتىياتسىزلىقتىن ياۋا موگۇ يەۋالسا، كېسەللىك ئالامەتلىرىنىڭ كۆرۈلىشىنى ساقلىماڭ. دەرھال زەھەر ئۇچۇر مەركىزىگە 131126 تېلېفون قىلىڭ ۋە ئۇلارنىڭ تەۋسىيەسى بويىچە ئىش كۆرۈڭ.
- ياۋا موگۇ يېگەندىن كېيىن كېسەل بولۇپ قالغانلار جىددىي داۋالاشنى كېرەك.
- جىددى ئەھۋال ئاستىدا، ھەمىشە ئۈچ نۆل (000) گە تېلېفون قىلىڭ.

## ياۋا موگۇدىن زەھەرلىنىشنىڭ ئالامەتلىرى:

< ئاشقازان قاتتىق ئاغرىش

< قورساق ئاغرىش

< قۇسۇش

< كۆڭلى ئاينىش

< ئىچ سۈرۈش

كېسەللىك ئالامەتلىرى ئادەتتە موگۇ يېگەندىن كېيىن 3-6 سائەتتىن كېيىن باشلىنىدۇ، 3 كۈنگىچە داۋاملىشىدۇ.

ئەڭ خەتەرلىك موگۇلار كېسەللىك ئالامەتلىرىنى كېچىكتۈرۈپ ئاشكارىلىيالايدۇ. بەزىلىرى يېگەندىن كېيىنكى 24 سائەتتە ئاندىن كۆرىلىدۇ.

[www.sahealth.sa.gov.au/mushroompoisoning](http://www.sahealth.sa.gov.au/mushroompoisoning)

