

ការណែនាំអំពីការលេបថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែក

ព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកជំងឺ ក្រុមគ្រួសារ និងអ្នកថែទាំ

ហេតុអ្វីបានជាជាតិដែកមានសារសំខាន់ ?

រាងកាយរបស់យើងត្រូវការជាតិដែក។ ជាតិដែកត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតអេម៉ូក្លូប៊ីន - ជាផ្នែកមួយនៃកោសិកាឈាមក្រហមរបស់អ្នកដែលដឹកនាំអុកស៊ីសែនទៅជុំវិញរាងកាយរបស់អ្នក។ វាក៏មានសារសំខាន់ផងដែរសម្រាប់រក្សាការងារនៃសាច់ដុំ ថាមពល និងមុខងារផ្លូវចិត្តឱ្យបានល្អ។ ប្រសិនបើអ្នកមានកម្រិតជាតិដែកទាប វាអាចធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំង និងមិនអាចបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃដូចធម្មតា។ កាលណាបរិមាណជាតិដែកក្នុងរាងកាយធ្លាក់ចុះកាន់តែទាប នោះកម្រិតអេម៉ូក្លូប៊ីនក៏ធ្លាក់ចុះទាបក្រោមកម្រិតធម្មតាដែរ។ នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការស្លេកស្លាំងដោយសារកង្វះជាតិដែក។

ហេតុអ្វីបានជាគេអាចចេញថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែក ឬថ្នាំទឹកជាតិដែកឱ្យខ្ញុំ ?

វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនឹងចេញថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែក ឬថ្នាំទឹកជាតិដែកនៅពេលលទ្ធផលតេស្តឈាមបង្ហាញថាអ្នកត្រូវការជាតិដែកបន្ថែម។ ពេលណាមានជាតិដែកក្នុងកម្រិតទាប វាជាការលំបាកក្នុងការទទួលបានជាតិដែកគ្រប់គ្រាន់មកវិញ ទៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ប្តូររបបអាហាររបស់អ្នក។ ថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែក និងថ្នាំទឹកជាតិដែកមានផ្ទុកជាតិដែកកម្រិតខ្ពស់ជាងអាហារ។ វាជួយបំពេញជាតិដែកកាន់តែច្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ អ្នកគួរលេបថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែក ពេលណាវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកបានណែនាំឱ្យធ្វើដូច្នោះ។

តើថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែក ឬថ្នាំទឹកជាតិដែកសុទ្ធតែដូចគ្នាទាំងអស់ឬ ?

ទេ? បរិមាណនៃជាតិដែកក្នុងថ្នាំគ្រាប់ ឬថ្នាំទឹកជាតិដែកផ្សេងៗគ្នា ប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំង។ ថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែក និងថ្នាំប៉ូរផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនអាចទិញបានដោយគ្មានសំបុត្រពេទ្យ (ដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជា) ប៉ុន្តែមិនមែនថ្នាំទាំងអស់នោះមានផ្ទុកជាតិដែកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនោះទេ។ ជាការសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវលេបថ្នាំ តាមការណែនាំដោយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។

តើខ្ញុំលេបថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែកដោយរបៀបណា ?

- > អនុវត្តតាមការណែនាំដោយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ពីចំនួនគ្រាប់ថ្នាំ និងពេលណាដែលអ្នកគួរតែលេប
- > លេបថ្នាំគ្រាប់ទាំងមូល មិនត្រូវកិន ឬទំពារ
- > ជាតិដែកស្រូបយកបានល្អបំផុតនៅពេលក្រពះទទេ (មួយម៉ោងមុន ឬពីរម៉ោងបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារ) ជាមួយទឹក ឬទឹកផ្លែឈើមួយកែវ។ វីតាមីន C នៅក្នុងទឹកផ្លែឈើ អាចជួយឱ្យជាតិដែកស្រូបចូលទៅក្នុងរាងកាយ ប៉ុន្តែមិនមានសារៈសំខាន់ទេ - ទឹកគឺល្អជាង
- > កុំលេបថ្នាំគ្រាប់ ឬថ្នាំទឹកជាតិដែកជាមួយទឹកតែ កាហ្វេ ទឹកដោះគោ ស្ករក្រូច និងក្រូច ឬស្រាទំពាំងបាយជូរ ពីព្រោះគេសង្ឃឹមថាទាំងនេះកាត់បន្ថយចំនួនជាតិដែកដែលស្រូបយកដោយរាងកាយ
- > កុំលេបថ្នាំដូចគ្នាទៅនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងការលេបថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែក ឬថ្នាំទឹកជាតិដែក - ថ្នាំជាតិកាល់ស្យូម ថ្នាំបន្សាបអាស៊ីត (ឧ. Mylanta និង Gaviscon) ថ្នាំមួយចំនួនសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺពុកផ្លូវចិត្ត ក្រពេញខានស្លាក់ Parkinson និងថ្នាំផ្សះមួយចំនួន។ សូមពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក អំពីចំនួនម៉ោងដែលត្រូវលេបថ្នាំដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។

ទុកឱ្យឆ្ងាយផុតពីដៃក្មេង

- > ថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែក ក៏ដូចជាថ្នាំទាំងអស់ដែរ គួរតែរក្សាទុកនៅក្នុងទូចាក់សោឱ្យឆ្ងាយផុតពីដៃក្មេង។
- > ជាតិដែកក្នុងបរិមាណតិចតួចអាចមានជាតិពុល ថែមទាំងបណ្តាលឱ្យទារក និងកុមារតូចៗស្លាប់ផងដែរ។
- > កុំឱ្យថ្នាំសម្រាប់មនុស្សធំ ទៅឱ្យកុមារលេប។
- > ប្រសិនបើកុមារលេបថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែកដោយចៃដន្យ សូមទូរស័ព្ទទៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីថ្នាំពុលភ្លាមៗ លេខ 131126 ។



ការណែនាំអំពីការលេបថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែក (ត)

តើខ្ញុំអាចទទួលបានផលវិបាករយៈពេលវែងអ្វីខ្លះ? តើខ្ញុំអាចកាត់បន្ថយដោយរបៀបណា?

មិនមែនមនុស្សគ្រប់រូបទទួលបានផលវិបាករយៈពេលវែងពីថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែក ឬថ្នាំទឹកជាតិដែកទេ។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានផលវិបាករយៈពេលវែង ជាញឹកញាប់ វានឹងកាន់តែគ្រាប់បើឡើង ខណៈពេលដែលរាងកាយរបស់អ្នកសំនឹងវា។ ផលវិបាករយៈពេលវែងរួមមាន៖

- > ទល់លាមក និងរាករូស។ ការមានសារធាតុរាវ និងជាតិសរសៃច្រើនក្នុងរបបអាហាររបស់អ្នក អាចជួយកាត់បន្ថយអាការៈទល់លាមក។ បើចាំបាច់ សូមសុំយោបល់ពីវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នកអំពីថ្នាំបញ្ចុះកម្រិតខ្សោយ ។
- > មិនស្រួលពោះ អាការៈចង់ចង្ហោរ (មានអារម្មណ៍ឈឺ) ឬឈឺពោះ (ឈឺចុកចាប់) ។ ការទទួលបានជាតិដែកជាមួយនឹងអាហារ ឬនៅពេលយប់អាចជួយអ្នកបាន។ រោគសញ្ញាទាំងនេះអាចជួយសម្រាល ដោយទទួលបានជាតិដែកក្នុងបរិមាណតិចតួច (ឧទាហរណ៍ លេបថ្នាំមួយគ្រាប់ ពីរ ឬបីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍) ឬទទួលបានជាតិដែកក្នុងកម្រិតថ្នាំទាបជាងរាល់ថ្ងៃ (ឧទាហរណ៍ ប្រើប្រាស់ថ្នាំទឹកជាតិដែក) និងបង្កើនចំនួនថ្នាំជាសន្សឹមៗ - ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះគួរតែធ្វើឡើង បន្ទាប់ពីបានពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។
- > ជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែកធ្វើឲ្យលាមករបស់អ្នក ប្រែក្លាយទៅជាពណ៌ខ្មៅ។

មានមនុស្សមួយចំនួនមិនអាចទទួលបានថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែក ឬថ្នាំទឹកជាតិដែក។ ប្រសិនបើការនេះកើតឡើងចំពោះអ្នក សូមកុំបារម្ភ ដ្បិតអ្នកជាតិដែកអាចចាក់ចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមតូចរបស់អ្នកបាន។ សូមស្នើសុំកូនសៀវភៅ ការចាក់ជាតិដែកតាមសរសៃឈាម ប្រសិនបើការណែនាំនេះអនុវត្តចំពោះអ្នក។

កិច្ចការខ្លះៗដែលត្រូវប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក

- ប្រសិនបើបច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកកំពុងប្រើថ្នាំណាមួយផ្សេងទៀតរួមបញ្ចូលទាំងថ្នាំគ្មានវេជ្ជបញ្ជា
- ប្រសិនបើអ្នកទិញថ្នាំបន្ថែមណាមួយដែលគ្មានវេជ្ជបញ្ជា សូមពិគ្រោះជាមួយឱសថការី ដើម្បីឲ្យបានច្បាស់ប្រាកដថាអ្នកអាចលេបថ្នាំទាំងនេះជាមួយថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែក ឬថ្នាំទឹកជាតិដែករបស់អ្នកបានឬអត់
- ប្រសិនបើលាមករបស់អ្នកមើលទៅពណ៌ខ្មៅ ឬក្រហម
- ប្រសិនបើអ្នកមានការឈឺចុកចាប់ ឬឈឺពោះ
- បើផលវិបាករយៈពេលវែងណាមួយកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកបារម្ភ

តើខ្ញុំនឹងត្រូវការលេបថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែកយូរប៉ុណ្ណា?

ការនេះអាស្រ័យលើមូលហេតុដែលអ្នកខ្វះជាតិដែក និងរបៀបដែលអ្នកឆ្លើយតបទៅនឹងការព្យាបាល។ រយៈពេលនៃការព្យាបាលជាធម្មតាយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវការពេលពីរឬបីខែ។ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនឹងរៀបចំធ្វើតេស្តឈាមបន្ថែមទៀត ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើថ្នាំទាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពឬអត់ និងរៀបចំគម្រោងការព្យាបាលដល់អ្នកបន្ថែមទៀត។ សូមឲ្យបានច្បាស់ប្រាកដថា អ្នកសួរថាតើពេលណាដែលត្រូវលេប។

ក៏អាចមានពេលខ្លះដែលអ្នកត្រូវការលេបថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែកក្លាយជាផងដែរ (ឧ. មុនពេលធ្វើការឆ្លុះពោះរៀន ឬបន្ទាប់ពីការវះកាត់)។ ប្រសិនបើត្រូវលេបថ្នាំ ត្រូវឲ្យបានច្បាស់ប្រាកដថា អ្នកដឹងនៅពេលណាដែលអ្នកត្រូវចាប់ផ្តើមលេបម្តងទៀត។

ផែនការលេបថ្នាំជាតិដែករបស់ខ្ញុំ៖ ឈ្មោះថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែកដែលណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់៖

ឬថ្នាំទាំងនេះណាមួយដែលបានគូសក្នុងរង្វង់មូល៖
 Ferro-tab, Ferro-f-tab, FGF, Fefol, Ferrogradumet, Ferrograd C, Maltofer

កម្រិតថ្នាំ/កាតព្វកិច្ចដែលត្រូវលេប៖

ថ្ងៃខែចាប់ផ្តើម៖ ថ្ងៃខែនៃការធ្វើតេស្តជាបន្ត៖

កំណត់ចំណាំផ្សេងទៀត៖

.....

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖
 សូមនិយាយទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក គិលានុប្បដ្ឋាក ឱសថការី
 សម្ភារៈសម្រាប់អ្នកជំងឺ អាចទទួលបានពីរឺបសាយ៖
www.sahealth.sa.gov.au/bloodorgantissue

