

زهرجن ځنگلي مرخپري



- < خطرناک ځنگلي مرخپري معمولاً د مني د لومړيو ښو بارانونو څخه وروسته څرگنديږي.
- < دوی په ډيری ځايونو کې موندل کيږي ، د بيا بانونو، ځنگلونو، عامه پارکونو، د لوبو ډگرونو، د ښوونځي د ساحو، د مال څرولو د ساحو او کور ته نږدې ستاسو د خپل کور د باغونو، زراعتي ښورو، ښورو يا وښو په گډون.
- < کله چې تاسو بهر ياست نو د خپلو ماشومانو او څارويو له نږدې څخه څارنه کوئ ځکه چې مرخپريو ته لاسرسی آسانه او د خوړلو لپاره په زړه پوري ښکاري.
- < هغه خلک چې په بهر کې ژوند کوي بايد خبر وي چې په آسټراليا کې زهرجن مرخپري په نورو هيوادونو کې د خوراک وړ مرخپريو ته ورته ښکاري.
- < د مرگ خولی مرخپري خورا خطرناک دي او کولی شي د ځگر وژونکي زيان لامل شي. پخول يا پوستول يې زهر نه لرې کوي. د مرگ خولی د بلوط، هزيل او شاه بلوط (چسټ نټ) ونو سره وده کوي، مگر وژونکي مرخپري هرچيرې وده کولی شي. يوازينی مرخپري چې د خوړلو لپاره خوندي دي هغه دي چې تاسو يې د باور وړ زرغون پلورونځی يا سوپر مارکيټ څخه اخلئ.
- < که چيرې يو څوک په ناڅاپي ډول يو ځنگلي مرخپري وخورې، نو انتظار مه کوئ چې ښې نښانې پيل شي د زهرو معلوماتو مرکز ته په ۱۳۱۱۲۶ شمېره زنگ ووهئ او د هغوی مشورې تعقيب کړئ.
- < هرڅوک چې د ځنگلي مرخپريو خوړلو وروسته ناروغه شي بايد عاجله طبي پاملرنه وغواړي. په بيرني حالت کې، تل درې ځله صفر (۰۰۰) ته زنگ ووهئ.

د ځنگلي مرخپريو د مسموميت نښې نښانې عبارت دي له :

< د معدې سخت دردونه

< د گيډې درد

< کانگې کول

< زړه بدوالی

< اسهال

نښې نښانې معمولاً د مرخپريو له خوړلو ۳ - ۶ ساعته وروسته پيل کيږي او تر ۳

ورځو پورې دوام کولای شي.

خورا خطرناک مرخپري کيدای شي ځنډنې نښې ولري چې د خوړلو وروسته تر ۲۴

ساعتونو پورې پيل کيدای شي .

www.sahealth.sa.gov.au/mushroompoisoning

